

TROISIÈME SUPPLÉMENT  
AU  
CATALOGUE DES BUPRESTIDES  
DU CONGO BELGE (1)

PAR  
Ch. KERREMANS

---

*Sternocera variabilis* KERREM. — Katanga : Nieuwdorp (Mission LEPLAE).

*Acmaeodera Katangae* KERREM. — Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE).

\* *Acmaeodera virgo* BOHEM., Oefv. Vet. Akad. Förh. (1860), p. 2; KERREM., Monogr. Bupr., II, pl. 15, fig. 1. — Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE).

\* ***Acmaeodera Schultzei*** KERREM, n. sp., Mitt. Naturhist. Mus. Hamburg (*sous presse*). — Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE).

---

(1) Collections du Musée du Congo belge, à Tervueren.

\* Les espèces dont le nom est précédé d'un astérisque sont nouvelles pour la faune du Congo belge. — La bibliographie n'est indiquée que pour ces espèces.

- \* *Acmaeodera irrorella* CAST. et GORY, Monogr. Bupr., I (1835), p. 16, pl. 5, fig. 25. — Katanga Élisabethville; Kapiri (Mission LEPLAE).
- \* *Acmaeodera posticalis* CAST. et GORY, Monogr. Bupr., I (1835), p. 28, pl. 8, fig. 47 (♀) = *repercussa* CAST. et GORY., l. c., p. 29, pl. 11, fig. 50 (♂). — Katanga: Élisabethville (Mission LEPLAE), un seul exemplaire ♀.
- Steraspis calida* HAR. — Katanga : Nieuwdorp (Mission LEPLAE).
- Steraspis ambigua* FÄHR. — Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE).
- \* *Steraspis subbrevicornis* THOMS., Typ. Bupr., app. 1 a (1879), p. 7. — Kindu (M. BURGEON).
- Psiloptera (Damarsila) pupillata* KLUG. — Kalassa (D'BEQUAERT); Katanga : Élisabethville, Nieuwdorp (Mission LEPLAE).
- Psiloptera (Damarsila) amaurotica* KLUG. — Katanga : Nieuwdorp (Mission LEPLAE).
- Psiloptera (Damarsila) muata* HAR. — Kindu (M. BURGEON); Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE).
- Sphenoptera camerunica* KERREM. — Katanga : Élisabethville, Welgelegen (Mission LEPLAE).
- \* *Sphenoptera neglecta* KLUG, Erm. Atl. (1835), p. 30. — Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE).
- \* *Sphenoptera viridimicans* KERREM., Monogr. Bupr., VI (1913), p. 504. — Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE).
- Sphenoptera trispinosa* KLUG. — Kindu (M. BURGEON).
- Sphenoptera sublaevis* KERREM. — Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE).
- \* *Sphenoptera divisa* KERREM. Monog. Bupr., VI (1913), p. 494. — Kapiri (Mission LEPLAE); Kasai : Kondué (E. LUJA).

- \* *Sphenoptera intermixta* QUEDEF., Berl. Ent. Zeit. (1885), p. 20. — Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE).
- \* *Sphenoptera alternecostata* JAKOWLEFF, Hor. Soc. Ent. Ross., XXXVI (1913), p. 232.
- \* *Sphenoptera maculata* CAST. et GORY, Monogr. Bupr., II (1839), Evagora, p. 5, pl. 2, fig. 7.
- \* ***Sphenoptera Leighi*** KERREM., n. sp., Monogr. Bupr., VII (sous presse). — Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE).
- \* *Sphenoptera obesa* THOMS., Typ. Bupr. (1878), p. 67. — Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE).
- \* *Sphenoptera fulgens* GORY, Monogr. Bupr., II (1841), p. 309, pl. 52, fig. 304. — Kilwa (D<sup>r</sup> BEQUAERT); Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE).
- \* *Sphenoptera solida* JAKOWL., Hor. Soc. Ent. Ross., XXXV, (1900), p. 340. — Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE).
- Anthaxia pilifrons* KERREM. — Katanga : Welgelegen (Mission LEPLAE).
- \* *Anthaxia Hauzeri* KERREM., Ann. Soc. Belg., XLIV (1900), p. 304. — Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE).
- \* ***Anthaxia ventralis*** n. sp.

Longueur : 5 millimètres; largeur : 1<sup>mm</sup><sub>4</sub>.

Oblong-ovale, plan en dessus, d'un noir bleuâtre avec les côtés postérieurs du pronotum et l'abdomen cuivreux pourpré ou doré.

Tête plane, impressionnée au-dessus de l'épistome, couverte de points ocellés extrêmement fins et très rapprochés. Pronotum grand, convexe en avant, largement et transversalement impressionné de part et d'autre sur les côtés, le long de la base; sa plus grande largeur un peu avant le milieu; bisinué en avant, tronqué en arrière; les côtés arqués; la surface couverte de très fines ridules irrégulières et transversales, sauf sur les parties cuivreuses des côtés, qui sont couvertes de points ocellés. Écusson triangulaire. Elytres impressionnés à la base, avec un calus huméral oblique et saillant, étroitement rebordés sur les côtés, le sommet séparément arrondi et fine-

ment dentelé; la surface couverte de rugosités très fines et très égales, simulant de très fines écailles. Dessous moins rugueux que les élytres, avec le sternum couvert de points ocellés plus larges que ceux de la tête et l'abdomen couvert de points aciculés.

Katanga : Élisabethville, Nieuwdorp (Mission LEPLAE).

\* *Anthaxia aenea* CAST. et GORY, Monogr., II (1839), p. 7, pl. 2, fig. 9. — Kindu (M. BURGEON); Katanga : Tshisenda, Nieuwdorp (Mission LEPLAE).

*Anthaxia albovillosa* KERREM. — Kindu (M. BURGEON); Katanga : Élisabethville; Nieuwdorp (Mission LEPLAE).

\* ***Anthaxia aterrima*** nov. sp.

Longueur : 5<sup>mm</sup>5; largeur : 1<sup>mm</sup>5

Plus allongé et un peu plus grêle que l'*A. ventralis* qui précède, un peu plus acuminé en arrière, entièrement noir, très légèrement bronzé, la fossette frontale nulle; le pronotum moins convexe sur le disque et moins fortement impressionné sur les côtés, l'impression moins transversale, fossiforme, située plus avant et plus près du bord, la surface couverte de points ocellés plus apparents; les dents terminales des élytres moins accentuées, presque nulles; le dessous couvert de traces d'une courte pubescence blanche espacée.

Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE).

\* ***Anthaxia rubifrons*** nov. sp.

Longueur : 5 millimètres; largeur : 1<sup>mm</sup>5.

Écourté, relativement large, les côtés parallèles, le sommet atténué, front ♂ d'un cuivreux éclatant, ♀ concolore, pronotum cuivreux bronzé clair, élytres d'un cuivreux plus sombre et légèrement pourpré; dessous bronzé obscur couvert d'une pulvérulence blanche, avec le milieu de l'abomen bleuâtre.

Tête aussi large que le pronotum, très finement et régulièrement granuleuse, couverte d'une très courte pubescence blanche. Pronotum presque carré, peu convexe, avec une impression dans chacun des angles antérieurs, une impression plus faible au milieu du disque et une fossette au-dessus de l'écusson; la marge antérieure faiblement bisinuée; les côtés à peine arqués, la base tronquée; la surface plus finement rugueuse que la tête, et couverte de très fines ridules sinueuses avec quelques points ocellés sur les angles

postérieurs. Ecusson triangulaire. Élytres transversalement déprimés à la base, rebordés sur les côtés, séparément arrondis et dentelés au sommet; la surface très finement granuleuse. Dessous couvert de points ocellés en avant et aciculés en arrière.

Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE).

*Chrysobothris gabonica* KERREM. — Kasai : Kondué (E. LUJA).

*Chrysobothris costifer* KERREM. — Kapiri ; Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE).

\* **Chrysobothris Gebieni** KERREM., nov. sp., Mitt Naturhist. Mus. Hamburg, XXX (1913), p. 5. — Kindu (M. BURGEON).

*Chrysobothris dorsata* FAB. — Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE).

*Chrysobothris fatalis* HAR. — Katanga : Élisabethville, Nieuw-dorp, Tshisenda (Mission LEPLAE).

\* *Actenodes gabonica* THOMS, Arch. Ent., II (1858), p. 74. — Kasai : Kondué (E. LUJA).

\* *Actenodes aenea* GORY, Monogr. Supp., IV (1841), p. 185, pl. 31, fig. 182. — Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE).

*Megactenodes Westermanni* CAST. et GORY. — Kindu (M. BURGEON).

*Megactenodes chrysifrons* QUEDENF. — Kindu (M. BURGEON).

*Megactenodes unicolor* CAST. et GORY. — Kasai : Kondué (E. LUJA).

*Strigulia pygmaea* KERREM. — Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE).

\* **Strigulia nigritorum** nov. sp.

Longueur : 5<sup>mm</sup>5 ; largeur : 1<sup>mm</sup>5.

Plus petit et un peu moins robuste que le *S. cyclodera* Fairm., les élytres moins rugueux ; entièrement noir en dessus, dessous d'un noir légèrement bleuâtre.

Tête étroite, largement sillonnée, couverte de rides sinueuses et transversales. Pronotum très grand, largement arqué sur les côtés, le lobe médian de la marge antérieure du pronotum très avancé et couvrant presque entièrement la tête, une carène oblique longeant la marge latérale à une certaine distance de celle-ci et formant la corde dont elle est l'arc; le milieu du disque avec deux vagues fossettes situées en avant, près du lobe antérieur; la surface couverte de fines rides transversales, sinueuses et parallèles. Élytres très légèrement gondolés sur les côtés et sur le disque, couverts de rugosités simulant des écailles moins accentuées que chez le *S. cyclodera*. Dessous beaucoup moins rugueux que le dessus.

Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE).

\* *Melibaeus laevipennis* KERREM. — Katanga : Elisabethville (Mission LEPLAE).

\* **Melibaeus amabilis** NOV. sp.

Longueur : 9<sup>mm</sup>5; largeur : 3<sup>mm</sup>3.

Robuste, écourté, convexe, les élytres avec une côte médiane lisse, interrompue un peu avant le sommet, entre deux côtes plus vagues, moins lisses et plus courtes. Dessus entièrement vert ou vert bleuâtre; dessous vert avec la base ou l'entièreté du premier segment abdominal et les pattes bronzé-cuivreux terne.

Rappelle le *M. crassus* CAST et GORY pour la forme robuste, mais la coloration est toute différente ainsi que les élytres, qui présentent des côtes et sont beaucoup plus rugueux.

Tête grossièrement et également ponctuée, rugueuse, légèrement concave et étroitement sillonnée sur toute sa longueur; antennes noires. Pronotum convexe, déclive en avant, aplani sur les côtés, plus large que long et plus étroit en avant qu'en arrière, sans carène latérale distincte, couvert d'une ponctuation épaisse, semblable à celle de la tête, et dont les intervalles forment des rides sinueuses; les côtés à ponctuation plus fine que celle du disque. Écusson grand, triangulaire, finement granuleux. Élytres convexes, déclives en arrière, séparément arrondis et dentelés au sommet; une côte médiane lisse n'atteignant ni la base ni le sommet, située entre deux côtes plus courtes, plus rugueuses et moins nettes; la surface très rugueuse formant, entre les côtes, des rides transversales plus accentuées vers la base qu'au sommet. Dessous moins rugueux que le dessus, la ponctuation abdominale aciculée; mentonnière du prosternum bilobée; toute la surface inférieure couverte d'une courte pubescence blanchâtre, peu apparente.

Katanga : Élisabethville et Nieuwdorp (Mission LEPLAE).

*Melibaeus albopilosus* KERREM. — Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE).

\* *Melibaeus nodosus* THUNB., Act. Nov. Ups. (1827), p. 50. — Katanga : Élisabethville et Nieuwdorp (Mission LEPLAE).

\* **Melibaeus plexus** nov. sp.

Longueur : 6<sup>mm</sup>5; largeur : 1<sup>mm</sup>8.

Oblong, assez convexe, atténué en avant et en arrière, d'un vert bleuâtre, en dessus avec les bords du pronotum bronzés et couverts d'une pubescence grise; dessous noir, couvert d'une très courte pubescence blanchâtre.

Ressemble, pour le facis et la coloration, au *C. episcopalis* MANN., de la Perse, mais avec le milieu du pronotum beaucoup plus gibbeux.

Tête rugueuse, grossièrement ponctuée, largement creusée; antennes noires. Pronotum gibbeux, couvert de rides concentriques, largement arrondi sur les côtés en avant et sinueux en arrière. Écusson triangulaire, presque lisse. Élytres allongés, à calus huméral saillant, séparément arrondis au sommet, la surface assez régulièrement rugueuse, couverte de granulations inégales simulant très vaguement de petites écailles. Dessous plus finement granuleux que le dessus, surtout sur l'abdomen; mentonnière du prosternum bilobée.

Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE); Usambara.

\* **Melibaeus dorsalis** nov. sp.

Longueur : 5 millimètres; largeur 1<sup>mm</sup>3.

Écourté, convexe, vert foncé en dessus, le dessous noir avec l'abdomen pourpré clair, ses segments frangés d'une pubescence blanche.

Plus petit que le *M. splendidiventris* KERREM., de l'Afrique orientale, il lui ressemble pour la coloration, et à première vue on pourrait le prendre pour un petit exemplaire de cette espèce, dont il s'écarte surtout par la forme du pronotum, qui est moins largement arrondi et moins dilaté sur les côtés.

Tête assez forte, déprimée en avant et sillonnée en arrière, couverte d'une ponctuation assez épaisse entre quelques rides sinueuses. Pronotum régulièrement convexe, mais non gibbeux, bisinué en avant et en arrière, les côtés étroitement aplanis et faiblement arqués; la surface couverte de rides sinueuses, non concentriques. le milieu du disque vaguement sillonné entre deux fossettes peu apparentes. Écusson en triangle plus large que long, le milieu longitudinalement sillonné. Elytres finement granuleux, séparément arrondis au sommet, le calus huméral assez saillant; la moitié interne

aplanie, l'externe déclive. Dessous moins rugueux que le dessus; mentonnière du prosternum bilobée.

Kapiri et Kundelungu (D<sup>r</sup> BEQUAERT).

\* **Melibaeus bicoloratus** nov. sp.

Longueur : 6 millimètres; largeur : 2 millimètres.

Allongé, assez convexe, la tête noire, le pronotum bleu, garni sur les côtés d'une pubescence blanche, les élytres bronzé doré clair avec quelques espaces bleu d'acier; dessous noir brillant couvert d'une très courte pubescence blanchâtre agglomérée en tache de chaque côté du troisième segment abdominal.

Tête granuleuse, creusée et entièrement sillonnée. Pronotum gibbeux, un peu plus large que long et plus étroit en avant qu'en arrière; les côtés arqués et aplanis; la base bisinuée; la surface rugueuse et couverte de rides sinueuses et concentriques. Écusson claviforme, pourpré. Élytres assez convexes, déclives en arrière, séparément arrondis au sommet, couverts de rugosités simulant de très petites écailles irrégulières. Dessous beaucoup moins rugueux que le dessus, finement ponctué; mentonnière du prosternum bilobée.

Katanga : Nieuwdorp (Mission LEPLAE); Tuevo (R. MAYNÉ).

\* **Melibaeus coraeoides** nov. sp.

Longueur : 6 millimètres; largeur : 1<sup>mm</sup>3.

Subcylindrique, allongé, étroit, atténué en avant et en arrière, le pronotum gibbeux; entièrement noir, mais le dessous d'un noir moins intense et légèrement bronzé, couvert d'une courte pubescence grisâtre peu apparente et laissant, au tiers postérieur des élytres, une large bande transversale dénudée.

Tête granuleuse, sillonnée sur toute sa longueur. Pronotum gibbeux en arrière sur le disque, à peine plus long que large, plus étroit en avant qu'en arrière; les côtés obliquement atténués en ligne droite en avant et convergents en arrière près de la base; la surface très rugueuse mais sans rides apparentes. Écusson triangulaire et mat. Élytres peu convexes, séparément arrondis en arrière, moins rugueux que le pronotum. Dessous ponctué, plus lisse que le dessus; marge antérieure du prosternum bilobée.

Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE).

*Melibaeus fasciatus* KERREM. — Kundelungu (D<sup>r</sup> BEQUAERT).

\* *Pseudagrilus melliculus* GORY, Monogr. Supp., IV (1841), p. 266, pl. 45, fig. 261. — Katanga : Nieuwdorp (Mission LEPLAE).

\* *Pseudagrilus sophorae* FAB., Ent. Syst., I (1794), p. 215). — Kasongo (PONS).

\* **Cryptodactylus Maynei** nov. sp.

Longueur : 4<sup>mm</sup>8; largeur : 1<sup>mm</sup>3

Allongé, le pronotum très développé et largement arrondi sur les côtés, entièrement noir, les élytres avec des traces de bandes flexueuses formées par une courte pubescence grise, situées après le milieu.

Tête étroite, convexe, avec un sillon longitudinal élargi en arrière sur le vertex; la surface très finement et densément pointillée. Pronotum grand, plus large que long, sa plus grande largeur avant le milieu; la marge antérieure formant un large lobe arrondi et avancé sur la tête; les côtés largement arqués; la base bisinuée avec un lobe médian avancé et tronqué; le milieu du disque impressionné en avant, l'impression arrondie et située plus près de la marge antérieure que de la base; de chaque côté du disque, un sillon arqué limité extérieurement par une carène perpendiculaire à la base et formant la corde de l'arc formé par les côtés; la surface couverte de très fines rides sinueuses et parallèles. Écusson petit, triangulaire. Élytres arrondis à l'épaule, sinués sur les côtés, légèrement élargis au tiers postérieur, atténués ensuite jusqu'au sommet; celui-ci séparément arrondi et très finement dentelé; la base impressionnée; la région suturale déprimée en arrière; la suture carénée; la surface couverte de rugosités formant des reliefs transversaux, surtout à la partie antérieure du disque. Dessous moins rugueux et plus mat que le dessus; pas de sillon antennaire sous le pronotum; tibias largement arqués et tranchants en dehors, creusés en dessous pour l'insertion du tarse; ceux-ci peu développés.

Tuévo (R. MAYNÉ).

\* **Cryptodactylus nodosus** nov. sp.

Longueur : 4<sup>mm</sup>5; largeur : 0<sup>mm</sup>9.

Plus petit, plus étroit, la surface du dessus beaucoup plus inégale que chez le précédent, entièrement noir comme lui avec un léger reflet bronzé violacé en dessus, les élytres sans bandes pubescentes grises.

Tête plus large, plus profondément sillonnée, avec le vertex beaucoup plus saillant; pronotum moins arrondi sur les côtés, très inégal, profondément sillonné au milieu, creusé, de chaque côté, de deux ornières parallèles

n'atteignant pas le sommet, les intervalles de ces impressions formant de larges bourrelets saillants. Élytres beaucoup plus rugueux, plus plissés en travers avec une assez forte côte discale interrompue par endroits et n'atteignant ni la base ni le sommet. Dessous finement pointillé, presque lisse, un peu plus brillant que le dessus; antennes libres au repos; tibias largement arqués et tranchants en dehors, creusés en dessous pour l'insertion du tarse; les postérieurs échancrés vers le milieu de la tranche externe.

Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE).

\* **Alyssoderus magnus** nov. sp.

Longueur : 16 millimètres; largeur : 5 millimètres.

Ressemble aux *A. leucogaster* WIED. et *cornatus* THUNB., mais beaucoup plus grand et plus robuste, les reliefs du pronotum autrement disposés.

Robuste, allongé, assez convexe, acuminé en arrière entièrement bronzé cuivreux clair, un peu pourpré, couvert, dans les dépressions du dessus et du dessous, d'une pubescence ocrée, un peu dorée, retenant une pulvérulence d'un jaune terreux.

Tête largement creusée avec, de chaque côté, un relief anguleux le long du bord interne des yeux; épistome étranglé entre les cavités antennaires, un peu élargi vers l'avant, échancré à l'extrémité entre deux courtes dents aiguës; la surface couverte de rugosités écailleuses; antennes courtes, robustes, dentées à partir du cinquième article. Pronotum large, peu allongé, très inégal, plus étroit en avant qu'en arrière; les côtés arqués, la marge antérieure avec un lobe médian subanguleux et très avancé sur le vertex, la base bisinuée avec un large lobe médian avancé et arrondi; la surface fortement et inégalement ridée avec six gros reliefs et une carène prémarginale sinueuse, deux de ces reliefs à la base, angulaires, un, transversal, au milieu du disque, mais plus près de la base que de la marge antérieure, deux autres un peu transversaux situés de chaque côté, mais plus en avant que le précédent et le dernier formé par le lobe médian de la marge antérieure. Écusson un peu plus long que large. Élytres allongés, acuminés mais séparément arrondis en arrière, avec, de part et d'autre, une côte discale rugueuse, naissant du calus huméral entre deux côtes moins larges dont la présuturale plus courte que la prémarginale; une quatrième côte, entière, longe la marge latérale qui est lisse, ainsi que la suture; les espaces entre ces côtes plus grossièrement rugueux que les côtes elles-mêmes. Dessous beaucoup moins rugueux que le dessus, mais assez densément et grossièrement ponctué; prosternum sillonné, sans mentonnière; joues armées d'une forte dent aiguë; pattes peu robustes.

Plateau de Kipiri (Mission LEPLAE).

\* **Amorphosoma impressicolle** nov. sp.

Longueur : 7 millimètres; largeur : 1<sup>mm</sup>5.

Allongé, subparallèle, atténué en arrière, entièrement noir, quelquefois un peu bronzé sur le pronotum, les élytres garnis de taches ou de vagues bandes pubescentes de gris et sans dessin apparent.

Tête rugueuse, avec un profond sillon médian et le vertex bombé; les antennes courtes et libres au repos. Pronotum inégal avec deux larges impressions discales et une impression oblique le long de la carène latérale; celle-ci arquée; les intervalles de ces impressions assez saillants; les côtés un peu obliques en avant et légèrement convergents en arrière; la surface couverte de rides sinueuses et subparallèles, suivant l'allure des reliefs et des impressions. Écusson caréné transversalement. Élytres largement et peu profondément déprimés le long de la suture, impressionnés à la base, le calus huméral saillant; les côtés sinueux à la hauteur des hanches postérieures, légèrement élargis au tiers supérieur, obliquement atténués ensuite jusqu'au sommet; celui-ci séparément arrondi et très finement dentelé; la surface couverte de rugosités simulant de fines écailles. Dessous moins rugueux que le dessus, finement ridé-punctué, la ponctuation aciculée; joues armées d'une très courte dent obtuse; marge antérieure du prosternum faiblement bilobée; pattes peu robustes; tibias normaux, cylindriques et droits; tarses postérieurs à premier article plus long que les suivants.

Katanga : Élisabethville, Welgelegen (Mission LEPLAE).

\* **Amorphosoma nodicolle** nov. sp.

Longueur : 8 millimètres; largeur : 2 millimètres.

Plus grand et plus robuste que le précédent, la tête plus large et le pronotum plus grand, tout le dessus beaucoup plus bossué sur le pronotum et plus rugueux sur les élytres; l'écusson plus grand, en rectangle élargi avec la carène formée par le bord postérieur, la pointe située sur un plan inférieur à celui-ci. Les antennes et les tarses plus grêles; le front avec deux impressions arrondies que surmonte en arrière un sillon profond du vertex, qui est plus saillant; le pronotum avec les impressions et les reliefs plus nombreux, ceux-ci plus grossièrement rugueux; les élytres à rides transversales plus apparentes et plus épaisses; la marge antérieure du prosternum moins lobée; le milieu du premier segment abdominal vaguement sillonné.

Katanga : Nieuwdorp (Mission LEPLAE).

\* *Phlocteis exasperata* SCHÖNH., Syn. Ins., App. (1847), p. 124. —

Katanga : Nieuwdorp (Mission LEPLAE).

\* *Agrilus sexguttatus* THUNB., Nov. Ins. Spec. Diss. (1789), pl. 5, fig. 11. — Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE).

*Agrilus purpuratus* KLUG. — Katanga : Élisabethville, Welgelegen (Mission LEPLAE).

*Agrilus albostictus* KERREM. — Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE).

\* **Agrilus Lujai** nov. sp.

Longueur : 9 millimètres; largeur : 2 millimètres.

Assez robuste et assez convexe; tête et pronotum bleu obscur à reflets pourpré sombre; élytres violacés avec de part et d'autre, un peu avant le milieu, une petite tache et vers le sommet une tache un peu plus grande et plus allongée formées par une courte pubescence gris blanchâtre. Dessous noir, plus mat que le dessus, avec quelques reflets pourpré sombre, notamment sur les pattes, et couvert d'une très courte pubescence grise.

Tête large, sillonnée, fortement bituberculée en arrière sur le vertex; la surface couverte de fines rides, circulaires sur les reliefs du vertex; antennes courtes, assez épaisses. Pronotum plus large que haut, à peine plus étroit en avant qu'en arrière; la marge antérieure bisinuée avec un large lobe médian arqué; les côtés subparallèles, à peine atténués vers l'avant; la carène postérieure très arquée, la marginale droite, l'inférieure arquée et rejoignant la précédente après le milieu; le disque avec une grande fossette préscutellaire surmontée d'un sillon transversal sous le lobe médian antérieur, ses côtés obliquement impressionnés au-dessus de la carène postérieure; la surface couverte de rides sinueuses et transversales. Écusson large, transversalement caréné et sillonné. Élytres allongés, largement impressionnés à la base, sinués à hauteur des hanches postérieures, légèrement élargis au tiers supérieur, atténués ensuite et acuminés au sommet, avec une assez forte dent médiane, une dent suturale plus courte et quelques petites dents sur les côtés; la surface couverte de rugosités simulant de fines écailles. Dessous finement ponctué-ridé; mentonnière du prosternum bilobée; pattes médianes.

Kasai : Kondué (E. LUJA).

\* **Agrilus histrio** nov. sp.

Longueur : 5 millimètres; largeur : 0<sup>mm</sup>9.

Petit, allongé, peu convexe, atténué en arrière, d'un noir violacé en dessus avec la tête et les antennes pourprées, celles-ci plus claires que celle-là, les bords du pronotum garnis d'une pubescence blanche agglomérés

en tache dans l'angle postérieur, les élytres ornés de part et d'autre de trois taches arrondies pulvérulentes de blanc, une à la base, une avant le milieu et la troisième au tiers postérieur; dessous bronzé obscur avec les bords des segments abdominaux couverts d'une pubescence gris blanchâtre, agglomérée en tache de chaque côté, à une certaine distance du bord.

Tête plane, impressionnée au milieu du front; vertex bombé et sillonné; antennes courtes et grêles; la surface couverte de très fines rides transversales et sinuées. Pronotum un peu plus large que haut et aussi étroit en avant qu'en arrière, largement lobé en avant, faiblement arqué sur les côtés, bisiné en arrière. Carène postérieure courte et arquée, la marginale sub-sinuée, l'inférieure très rapprochée de celle-ci en avant et la rejoignant vers le milieu; le disque vaguement impressionné en avant et en arrière, avec un large sillon arqué, peu profond, longeant la carène postérieure sur les côtés et l'impression de la base au milieu; la surface couverte de très fines rides sinuées. Écusson caréné transversalement. Élytres impressionnés à la base avec le calus huméral saillant, sillés sur les côtés à hauteur des hanches postérieures, légèrement élargis au tiers supérieur, atténués ensuite jusqu'au sommet, celui-ci séparément arrondi, subacuminé et très finement dentelé; la surface couverte de ridules simulant de très fines écailles. Dessous finement pointillé; mentonnière du prosternum avancée en arc; pattes peu robustes, normales.

Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE).

\* *Agrilus imbricatus* GORY, Monogr. Supp., IV (1841), p. 223, pl. 37, fig. 214. — Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE).

*Agrilus rubicundus* KERREM. — Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE).

\* ***Aphanisticus cylinderus*** nov. sp.

Longueur : 5 millimètres; largeur : 1 millimètre.

Allongé, subcylindrique, légèrement atténué en avant et en arrière, entièrement noir, luisant sur la tête, le pronotum et le dessous, très rugueux sur les élytres.

Tête luisante, aussi large que le pronotum, finement pointillée; front largement creusé. Pronotum un peu plus large que long et aussi large en avant qu'en arrière; la marge antérieure bisinuée avec un large lobe médian arrondi et avancé; le disque fortement caréné, la carène située plus près de la marge antérieure que de la base et étroitement sillonnée au milieu, bordée, en avant et en arrière, d'un large sillon transversal, l'antérieur plus étroit, le postérieur plus large et plus profond, légèrement arqué et séparé

de la base par un large bourrelet transversal; une carène postérieure courte et très arquée; les côtés subparallèles à carène marginale sinuense; la base bisinuée; la surface couverte d'un fin pointillé semblable à celui de la tête. Écusson très petit. Élytres plans sur le disque, légèrement déclives sur les côtés, séparément arrondis et subacuminés au sommet; la surface fortement mais également rugueuse, couverte de séries de gros points rapprochés et dont les intervalles forment des rides transversales. Dessous luisant, à ponctuation plus épaisse et plus espacée que celle du pronotum; pattes grêles, normales.

Katanga : Tshisenda, Élisabethville, Nieuwdorp (Mission LEPLAE); Mombasa.

\* **Aphanisticus docilis** nov. sp.

Longueur : 4 millimètres; largeur : 0<sup>mm</sup>6.

Plus étroit, plus grêle que le précédent, entièrement noir comme celui-ci, mais avec la tête convexe, non creusée mais sillonnée, le sillon plus large et plus profond en avant, linéaire en arrière; le pronotum plus allongé, sans carène ni sillons transversaux, le disque régulièrement convexe, la carène postérieure plus grande, allongée, à peine arquée, et limitée par une dépression oblique contournant le disque sur les côtés et le long de la base; les élytres beaucoup moins rugueux, à ponctuation plus fine, à rides transversales plus nettes quoique moins profondes.

Katanga : Nieuwdorp (Mission LEPLAE).

\* **Aphanisticus dolatus** nov. sp.

Longueur : 3 millimètres; largeur : 0<sup>mm</sup>8.

Entièrement noir; plus court relativement et plus large que le *docilis* qui précède, la tête plus large, beaucoup plus forte, largement creusée en avant et étroitement sillonnée en arrière, non convexe, mais moins profondément creusée que chez le *cylinderus*; le pronotum beaucoup plus court, ayant, comme celui-ci, une forte carène transversale légèrement creusée sur son milieu, mais avec deux impressions le long de la base plus profondes et séparées au milieu par une carène médiane perpendiculaire à la transversale; les élytres plus courts, présentant les mêmes rugosités que chez le *cylinderus*.

Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE); Nouvelle-Anvers (BURGEON).

\* **Aphanisticus capitatus** nov. sp.

Longueur : 3<sup>mm</sup>2 ; largeur : 0<sup>mm</sup>7.

Entièrement noir ; plus allongé et plus cylindrique que le *dolatus* qui précède, la tête tout aussi forte, plus largement creusée en avant et non sillonnée en arrière, à points plus grossiers ; le pronotum à points épais, tout autrement construit que celui des trois espèces précédentes, se rapprochant de celui du *cylindrus*, mais d'une façon beaucoup moins accentuée, la carène transversale transformée en simple élévation convexe et sans carène postérieure ; les élytres semblables, pour la structure, à ceux de cette espèce, mais avec la ponctuation moins profonde.

Katanga : Élisabethville, Nieuwdorp (Mission LEPLAE).

\* **Aphanisticus curvicolis** nov. sp.

Longueur : 3 millimètres ; largeur : 1 millimètre.

Largement arrondi en avant, sinué sur les côtés et atténué en arrière, entièrement noir.

Tête très étroite, caniculée sur toute sa longueur, convexe et finement pointillée. Pronotum grand, plus large que long, aussi large en avant qu'en arrière, sa plus grande largeur avant le milieu ; la marge antérieure échancrée en arc avec les angles latéraux avancés et arrondis ; les côtés aplanis largement arqués en avant et sinués en arrière, près de la base, avec les angles postérieurs légèrement saillants en dehors ; la base bisinuée ; le disque légèrement convexe ; la surface finement pointillée avec une très légère dépression transversale en avant, un peu après le milieu et une autre dépression, plus nette, longeant la base et remontant sur les côtés. Élytres largement déprimés le long de la suture depuis le milieu jusqu'au sommet, la suture carénée le long de cette dépression ; la surface couverte de points disposés en vagues séries longitudinales entre des rides transversales, celles-ci plus accentuées vers la base que vers le sommet. Dessous plus mat que le dessus ; pattes grêles.

Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE).

\* *Aphanisticus nodosus* GERSTAECKER, Arch. f. Nat., XXXVII (1871), p. 58. — Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE).

\* **Aphanisticus Burgeoni** nov. sp.

Longueur : 3 millimètres ; largeur : 1<sup>mm</sup>3.

Atténué en arrière, entièrement noir, sa plus grande largeur au tiers postérieur des élytres.

Tête allongée et étroite, profondément creusée, avec les bords tranchants le long des yeux, lisse et brillante. Pronotum subcordiforme, plus large que long, sa plus grande largeur au milieu; la marge antérieure tronquée le long de la tête et anguleusement avancée sur les côtés; ceux-ci subanguleux, atténués et convergents en avant et en arrière avec les angles postérieurs obtus; le milieu du disque avec un large bourrelet transversal n'atteignant pas les côtés; deux bourrelets plus minces et moins saillants le long de la base; celle-ci bisinuée. Écusson très petit. Élytres arrondis à l'épaule avec le calus huméral saillant, sinueux ensuite, élargis au tiers postérieur, enfin obliquement atténués en ligne droite jusqu'au sommet; celui-ci obliquement tronqué et subarrondi de part et d'autre; la surface couverte de séries longitudinales de points entre une côte médiane entière et la suture, une côte plus courte faisant le prolongement du calus huméral et une côte prémarginale, ces deux dernières interrompues à hauteur des hanches postérieures. Dessous presque lisse, un peu mat; pattes normales.

Lusindoï (BURGEON); — Usambara.

*Aphanisticus fluviatilis* KERREM. — Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE).

\* *Aphanisticus Bottegoi* KERREM. Ann. Mus. Civ. Genov., (1899), p. 505. — Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE).

\* *Aphanisticus bilobiceps* KERREM., Wytsm. Gen. Ins., fasc. 12, Bup. (1913), p. 305. — Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE).

\* *Aphanisticus Victoriae* KERREM., Ann. Mus. Civ. Genov., (1910), p. 545. — Tuévo (R. MAYNÉ); Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE).

*Aphanisticus lembanus* KERREM. — Congo-da-Lemba (R. MAYNÉ); Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE).

*Aphanisticus Maynei* KERREM. — Congo-da-Lemba (R. MAYNÉ).

\* *Aphanisticus punctipennis* KERREM., Bol. Soc. Ent. Ital., (1906), p. 102.

*Trachys Folognei* KERREM. — Congo-da-Lemba (R. MAYNÉ); Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE).

*Trachys Schoutedeni* KERREM. — Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE).

\* *Trachys senegalensis* GORY, Monogr. Supp., IV (1840), p. 351, pl. 60, fig. 350. — Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE).

\* *Trachys massaica* KERREM., Sjöstedt Kilim. Meru Exped., Bupr., (1908), p. 29, pl. 1, fig. 7. — Congo-da-Lemba (R. MAYNÉ).

\* **Trachys comitessa** KERREM, nov. sp., Voy. ALLUAUD et JEANNEL en Afr. or., Bupr. (1913) (*sous presse*). — Tuévo (R. MAYNÉ).

\* **Trachys allecta** nov. sp.

Longueur : 4 millimètres; largeur : 2 millimètres.

Ovale, subgibbeux, largement arrondi en arrière, noir en dessus, la tête, le pronotum et les élytres couverts d'une pubescence roux doré, mêlée de quelques poils blancs, disposée, sur les élytres, en larges bandes flexueuses limitées en avant par une étroite bande blanche, ces bandes plus nettes en arrière. Dessous bronzé bruu, brillant et couvert d'une courte pubescence grise et très espacée.

Tête assez large, avec une dépression triangulaire en avant. Pronotum trois fois aussi large que haut, échancré en avant avec les angles antérieurs avancés et aigus; les côtés obliquement et irrégulièrement arqués et légèrement aplanis; la base bisinuée avec un large lobe médian aplani; le disque convexe; la surface couverte d'un fin pointillé inégalement espacé. Écusson petit, triangulaire. Élytres impressionnés à la base; le calus huméral saillant; les côtés régulièrement atténués en arc depuis la base jusqu'au sommet; celui-ci séparément arrondi; une côte prémarginale forme le prolongement du calus huméral et longe le bord à une certaine distance de celui-ci; la surface finement granuleuse sur les parties pubescentes et inégalement ponctuée sur les glabres. Dessous couvert de ridules aciculées très fines; mentonnière du prosternum entière et arquée en avant; pattes normales.

Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE). \*

\* **Trachys cara** nov. sp.

Longueur : 3 millimètres; largeur : 2 millimètres.

Plus petit, plus large en avant, plus atténué en arrière que le précédent, la tête, le pronotum et le dessous noirs, les élytres bleu obscur et très bril-

lants, ornés de deux bandes pubescentes, gris argenté, flexueuses et très étroites en arrière et de quelques amas de poils en avant; une carène prémarginale le long de la marge latérale, naissant du calus huméral dont elle forme le prolongement. Dessous couvert de points aciculés et superficiels; mentonnière de prosternum moins grande et plus arquée; le front, vu en dessus, plus sinué avec le bord externe, le long des yeux, plus tranchant.

Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE).

\* **Trachys tavetana** KERREM. nov. sp., Mitt. Naturhist. Mus. Hamburg, XXX (1913), p. 8. — Katanga : Élisabethville (Mission LEPLAE).

---